

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRIM DOCE  
EMPREGO PÚBLICO – EDITAL 004/2012**

**RECURSOS CONTRA A PROVA ESCRITA DE MÉDICO ESF**

**Questão número 05:**

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada.

DEFERIDO. A banca atende as razões dos candidatos e a questão será ANULADA, pontuando para todos os candidatos.

**Questão número 22:**

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada.

DEFERIDO. Atende razão aos candidatos. Dessa forma a questão será ANULADA, pontuando para todos os candidatos.

**Questão número 25:**

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada.

INDEFERIDO. O recurso não apresenta referências bibliográficas em sua citação, faz-se uso do senso comum, dessa forma a questão fica inalterada.

**Questão número 28:**

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada.

INDEFERIDO. O recurso não apresenta referências bibliográficas em sua citação, faz-se uso do senso comum, dessa forma a questão fica inalterada.

**Questão número 29:**

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada.

INDEFERIDO. Essa questão foi elaborada a partir do Caderno de Atenção Básica para Prevenção clínica de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais (2006) que tem como principal objetivo nortear planos de ação de cuidado integral, com foco na prevenção de doenças, sistematizando as condutas atuais recomendadas com base em evidências científicas para a identificação e manejo de indivíduos sem doença manifesta e em risco de desenvolverem doenças cardíacas ateroscleróticas, cerebrovasculares e renais, aqui denominadas conjuntamente de doenças cardiovasculares.

Dentro das intervenções preventivas renais, consta que no portador de DRC deve ser realizado o controle rigoroso da pressão arterial onde a intensidade do controle da pressão arterial e os níveis alvo variam de acordo com a presença de proteinúria (Brasil, 2006, p.45).

<b>Condição</b>	<b>Pressão Arterial</b>	<b>Tratamento 1a.escolha I</b>
Sem proteinúria	<140/90 mmHg	Hidroclorotiazida
Proteinúria < 1gr/24h	< 130/80 mmHg	Captopril ou Enalapril

Proteinúria	<125/75 mmHg	Captopril ou
>1gr/24h		Enalapril

Desta forma, é evidente que existe uma única alternativa correta, representada pela letra “C”. A presença de microalbuminúria com ou sem hipertensão deve ser tratada com um iECA (captopril, enalapril).

Referência:

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. *Prevenção clínica de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais*. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

### Questão número 31:

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada.

INDEFERIDO.

Afirmativa I: está incorreta, pois a transmissão da hepatite B é sexual não oral - fecal

Afirmativa II: está correta (Brasil, 2005, pg.17)

Afirmativa III: está correta (Brasil, 2005, pg 15)

Afirmativa IV: está incorreta, pois a indicação para tratamento de hepatite B crônica é indicado na idade superior a dois anos e ainda quando ALT/TGO > 2 vezes o limite superior da normalidade

Desta forma, segue corretas as afirmações II e III. Representadas corretamente pela alternativa "C"

Referência:

BRASIL. Hepatites virais: o Brasil está atento / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2005.

### Questão número 33:

Um candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada.

INDEFERIDO. A questão foi retirada de um artigo da USP (2003) que estabelece a conduta atual ao paciente com diarreia aguda. As condutas dirigidas aos pacientes hígidos com hematoquesia, manifestações clínicas sistêmicas ou sinais de desidratação ausentes estão corretamente descritas e apresentadas na alternativa “D”. As outras alternativas apresentadas, correspondem a alternativas incorretas, pois possuem condutas inválidas e/ou incoerentes, ou ainda condutas para outro tipo de paciente. Como por exemplo, na alternativa “C”, a conduta médica apresentada é para pacientes que estão com a temperatura < 38 °C, sem hematoquezia, manifestações sistêmicas ou sinais de desidratação ausentes. Contudo, nesta alternativa indica tratar as manifestações sistêmicas se houver.

O enunciado é claro ao informar que o paciente apresenta hematoquezia, mas as manifestações clínicas sistêmicas ou os sinais de desidratação estão ausentes.

Referência:

OLIVEIRA RB. Diarreia aguda. *Medicina, Ribeirão Preto*, 36: 257-260, abr./dez. 2003.

### Questão número 35:

Dois candidatos impetraram recursos sobre a questão mencionada.

DEFERIDO. A banca atende as razões dos candidatos. Dessa forma a questão será ANULADA, pontuando para todos os candidatos.